



En partant du témoignage de

Benoît ALBISETTI

Ferme BIZKEIA, à Moncayolle

La ferme

- Installés depuis **2018**
- **1 UTH**
- Statut : **Individuel**
- Signes de qualité : **IDOKI**,
AOP Ossau Iraty, AB
- Ateliers : **Ovin lait**
- Transformation : **Fromage de brebis au lait cru, lactiques, camembert**
- Commercialisation : **100% circuit court** (à la ferme, Biocoop...)
- SAU : **42 Ha** dont



■ Prairies ■ Luzerne ■ Fougères



Conduite des surfaces sans intrant chimique

- Quelles sont les spécificités de vos surfaces ?

Il y a de l'agrostille dans nos prairies, une plante qui étouffe tout, quand tu le retourne elle libère des toxines et rien ne germe. Contre cela j'avais essayé de faire du sur-semis, c'était très joli mais n'avais pas marché. On a aussi beaucoup de carotte sauvage, qui donne une forte odeur aux fourrages, et cela est moins plaisant pour les brebis. Les brebis mangent les endroits où il n'y a pas de carottes en premier. Je vois qu'il y en a un peu partout, même chez ceux qui sont en conventionnel.

- Quels leviers ?

Contre l'agrostille, je laboure le plus tôt possible, puis je laisse passer un mois avant de semer pour que les toxines s'évacuent. Aussi, j'aère un peu les prairies en superficiel avec une herse. Je donne beaucoup d'importance au pâturage tournant*, et je met de la chaux.

*voir zoom



Race : Basco-Béarnaises

"On concentre les brebis sur une zone entre 5 et 10 heures, donc elles amènent beaucoup de **matière organique** sur cette zone-là. En les déplaçant tous les jours, la matière organique a du temps pour se dégrader, donc la « merde » est déjà décomposée, elle n'a plus d'odeur, ça sent le terreau, et cela donne plus de **force au sol.**"



ZOOM : Le pâturage tournant dynamique

J'ai des couloirs de 50m de large, je mets un filet devant et un filet derrière, et tous les jours je déplace un filet. Je mets en place une ou deux bandes en fonction du nombre de brebis dans le lot. Je reviens tous les 20 - 30 jours, comme ça l'herbe a le temps de repousser et elle est toujours fraîche. Elles passent sur toute la parcelle à partir du 15 janvier et fin février le tour est fait, juste pour le déprimage. Ensuite quand l'herbe commence bien à pousser, je bloque sur une parcelle. Cette année je l'ai fait qu'avec 170 laitières, de début mars jusqu'à fin juin. Je les change tous les jours, j'essaie de leur laisser « 2000m² » de propre, en avançant les filets.

J'aimerais semer un couvert et mettre le fumier en novembre ou décembre, puis les faire pâturer sur le couvert pour ne pas toucher aux prairies et pouvoir faucher le plus souvent. Je les fais pacager, si ça pousse bien je le fauche, et si ça a pas trop poussé je le retourne et l'idée c'est de faire du maïs ou du soja par derrière.

- Quelles sont les améliorations que vous aimeriez porter sur la ferme ?

L'ancien propriétaire cultivait du maïs tous les ans. En BIO je ne suis pas équipé, j'ai pas le temps car le maïs nécessite 2 ou 3 passages, et les travaux doivent être effectués en même temps que les foin. J'ai fait une fois du méteil puis j'avais arrêté, par manque de temps. Cette année je m'installe en GAEC, donc j'aimerais casser des prairies et mettre en place plus de cultures.

Itinéraire technique

Prairies

- Fertilisation

Fumier composté avec ajout de bactéries : processus permettant l'aération du fumier et la réduction d'odeur.

- Amendement

Tous les 2 ans, épandage de chaux sur les prairies

- Travail du sol

Labour

Aération du sol : un passage de herse à prairie tous les deux ans

- Fourrages

Récolte de foin et regain sur toutes les parcelles

- Transhumance

Pour la récolte des fourrages, les prairies sont libres de fin juin jusqu'à début septembre, car le troupeau transhume en vallée d'Aspe. Cela permet d'assurer la réserve alimentaire hivernale.



Avec
la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

Liberté
Égalité
Fraternité

